

## 2016 - Atelier Pédagogique (4 QCM à améliorer)

Total Questions: 4

Most Correct Answers: #3

Least Correct Answers: #1

### 1. Quel est la caractéristique de ce QCM permettant d'expliquer le faible taux de réussite (0%)

françois

✗ formulation question

JJM

✗ 7 questions

VG

✗ fff

del

✗ trop de possibilités de réponses

Pb

✓ 7 items

Jerome

✗ 7 irels

Benjamin

✗ taille variable fond variable

Emilie

✗ TROP d'items différents

Natacha

✓ 7 items

Jeje

✗ nombre d'items

Question 3 1 0%

Moyenne points : 0.00  
Moyenne discordance : 1.07

Quelle sont les facteurs de risque vis à vis du pneumoecque à sensibilité diminuée?

| Reponse | Choix | Proportion                                       | Taux de cote | Sup | Inf  | Disc | Description |
|---------|-------|--------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|-------------|
| Vraie   | Non   | Mais de garde en collectivité                    | 95.83%       | 75% | 100% | 0%   | Insuffisant |
| Fausse  | Non   | Allergie                                         | 0%           | 0%  | 0%   | 0%   | Insuffisant |
| Vraie   | Non   | Age inférieur à 18 mois                          | 0%           | 0%  | 0%   | 0%   | Insuffisant |
| Fausse  | Non   | Hypertension des régulateurs artériels           | 2.22%        | 7%  | 0%   | 0%   | Faible      |
| Vraie   | Non   | Antécédents récents d'otite moyenne aigue        | 88.33%       | 80% | 100% | 0%   | Insuffisant |
| Vraie   | Non   | Prise d'anticoagulant dans les 3 mois précédents | 88.33%       | 80% | 100% | 0%   | Insuffisant |
| Fausse  | Non   | Tuberculose passif                               | 22.19%       | 10% | 0%   | 0%   | Insuffisant |

### 2. Quels sont les détails que vous modifiez pour améliorer ce QCM ?

1/11 (A) J'ajoute une réponse fausse inacceptable

1/11 (B) J'ajoute une réponse exacte indispensable

5/11 (C) Je modifie la question : que constatez vous ?

9/11 (D) je diminue le nombre d'items pour en retenir 5

5/11 (E) Pour insister sur le côté de l'oreille examiné : je remplace l'item "otoscopie droite" par "il s'agit d'un examen de l'oreille droite"

Vous disposez d'un total de 2 ans. Il y a un retard de langage. Vous devez une otoscopie. Que constatez vous ?



Ajouter une réponse

| Reponse | Choix | Proportion                        | Taux de cote | Sup  | Inf  | Disc | Description |
|---------|-------|-----------------------------------|--------------|------|------|------|-------------|
| Fausse  | Non   | Ecoute du conduit auditif externe | 2.5%         | 0%   | 7%   | 0%   | Insuffisant |
| Fausse  | Non   | Odeur externe                     | 5.8%         | 0%   | 0%   | 0%   | Insuffisant |
| Vraie   | Non   | Otoscopie droite                  | 0%           | 0%   | 0%   | 0%   | Insuffisant |
| Vraie   | Non   | Palpation des ganglions           | 97.83%       | 100% | 100% | 0%   | Insuffisant |
| Fausse  | Non   | Otoscopie gauche                  | 11.67%       | 10%  | 17%  | 0%   | Insuffisant |
| Fausse  | Non   | En l'absence d'une otite externe  | 25.19%       | 15%  | 0%   | 0%   | Insuffisant |

### 3. Quels sont les détails que vous modifiez pour améliorer ce QCM ?

- 8/11 ☒ A j'enlève un supplémentaire pour avoir 5 propositions
- 4/11 ☒ B J'enlève l'item "hospitalisation"
- 1/11 ☐ C J'enlève les items ayant moins de 10% de taux de coche
- 0/11 ☐ D J'enlève les deux items faux
- 8/11 ☒ E Tous les items proposés ne sont pas des traitements

Moyenne points : 0.27  
Moyenne discordance : 0.17

Quel(s) traitement(s) proposez-vous en urgence ?

**Afficher les détails**

| Réponse | Élimination | Proportion                             | Taux de coche | Sup  | Inf  | Disc | Discrimination |
|---------|-------------|----------------------------------------|---------------|------|------|------|----------------|
| Valide  | Non         | Antibiotérapie intraveineuse           | 97.82%        | 100% | 100% | 0%   | truffant       |
| Valide  | Non         | Hospitalisation                        | 0%            | 0%   | 0%   | 0%   | truffant       |
| Fausse  | Non         | Aspiracoeone                           | 7.23%         | 0%   | 0%   | 0%   | truffant       |
| Valide  | Non         | Pne antibiotie trans-tympanique gauche | 16.67%        | 0%   | 0%   | 0%   | truffant       |
| Valide  | Non         | Mastocoeone                            | 76.61%        | 71%  | 85%  | -15% | truffant       |
| Fausse  | Non         | Amptoeone                              | 1.42%         | 0%   | 0%   | 0%   | truffant       |

### 4. Pour améliorer ce QCM, il serait préférable de ne pas laisser 5 bonnes réponses sur les 5 items

- 4/11 ☒ A True
- 4/11 ☐ B False

Q15 Eprouve D'ABMD Avril 2016 PIR Q15

Moyenne points : 0.36  
Moyenne discordance : 1.62

Cochez l'item(s) correct(s) exact(s). Une réponse est 1/1.

**Afficher les détails**

| Réponse | Élimination | Proportion                                                 | Taux de coche | Sup  | Inf | Disc | Discrimination |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|------|-----|------|----------------|
| Valide  | Non         | Pne antibiotie due au diabète                              | 57.67%        | 71%  | 40% | 31%  | faible         |
| Valide  | Non         | Pne antibiotie due à l'hypertension intracranienne         | 86.61%        | 100% | 76% | 24%  | faible         |
| Valide  | Non         | Exercez une opoeone dans le regard du Q15 peripoe          | 76.61%        | 85%  | 76% | 0%   | truffant       |
| Valide  | Non         | Exercez une opoeone lorsque de la BMD tombe du Q15 peripoe | 86.61%        | 100% | 85% | 15%  | truffant       |
| Valide  | Non         | Exercez une opoeone lorsque de la BMD tombe du Q15 peripoe | 26.69%        | 37%  | 24% | 0%   | truffant       |